

A. Vă informăm că începând cu luna septembrie 2023, vaccinul gripal se prescrie de către medicii de familie pentru grupele populaționale la risc, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr.3120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în Regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, astfel:

A.1. Segmentul populațional care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință DCI-urilor, pentru vaccinarea împotriva gripei este format din persoanele cu vârsta > 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice;

A.2. Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor, pentru vaccinarea împotriva gripei, sunt următoarele:

1. copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;
2. gravide;
3. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:
 - 3.1. boli cardiovasculare cronice;
 - 3.2. boli respiratorii cronice;
 - 3.3. boli renale cronice;
 - 3.4. boli hepatice cronice;
 - 3.5. boli neurologice cronice;
 - 3.6. boli metabolice;
 - 3.7. boli oncologice;
 - 3.8. boli autoimune;
 - 3.9. malformații congenitale;
 - 3.10. obezitate;
 - 3.11. asplenie;
 - 3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA
 - 3.13. terapie imunosupresoare;
 - 3.14. transplant;
 - 3.15. imunosupresie congenitală;
4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani,
5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

B. Începând cu 01 decembrie 2023 se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, pentru segmentele populaționale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023. Unitățile de specialitate care implementează Programul național de vaccinare vor utiliza cu prioritate stocurile existente la nivelul DSP și vor raporta toate serviciile de vaccinare până la epuizarea stocurilor.

B.1. Începând cu 1 decembrie 2023, vaccinul împotriva infecției cu HPV se prescrie de către medicii de familie pentru grupele populaționale la risc, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023, astfel:

- segmentul populațional care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință a DCI-urilor, pentru vaccinarea împotriva infecției cu HPV, este format din femei cu vârsta ≥ 19 de ani și ≤ 45 de ani;
- segmentul populațional care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor, pentru vaccinarea împotriva infecției cu HPV, este format din persoane cu vârsta ≥ 11 ani și < 19 ani;

B.2. Începând cu 1 decembrie 2023, vaccinurile împotriva: infecției pneumococice, infecției meningococice, împotriva difteriei, tetanosului și pertusisului (tusei convulsive), hepatitei B, varicelei, rujeolei-oreionului-rubeolei, se prescriu de către medicii de familie pentru grupele populaționale la risc, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3120/2023, astfel:

a) pentru vaccinarea împotriva infecției pneumococice segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor sunt următoarele:

1. copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 01.10.2017;
2. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:
 - 2.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;
 - 2.2. asplenie;
 - 2.3. siclemie;
 - 2.4. boli respiratorii cronice;
 - 2.5. boli renale cronice;
 - 2.6. implant cohlear,
 - 2.7. terapie imunosupresoare;

- 2.8. transplant;
- 2.9. imunosupresie congenitală;
- 2.10. drenaj ventricular extern;
- 2.11. diabet zaharat;
- 2.12. boli cardiovasculare;
- 2.13. hepatopatii cronice;
- 2.14. leucemii, limfoame, mielom multiplu;
3. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;
4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

b) pentru vaccinarea împotriva infecției meningococice segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor sunt următoarele:

1. persoane cu vârsta ≥ 6 luni și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:
 - 1.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;
 - 1.2. asplenie;
 - 1.3. siclemie;
 - 1.4. boli oncologice;
 - 1.5. terapie imunosupresoare,
 - 1.6. transplant;
 - 1.7. imunosupresie;
 - 1.8. deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați), de exemplu: pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);
2. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;

c) pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și pertusis-ului (tusei convulsive) segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor, sunt următoarele:

1. gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelular - dTpa, adsorbit;
2. rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, pentru adulți;
3. persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice;
4. contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant;

d) pentru vaccinarea împotriva hepatitei B segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor, sunt următoarele:

1. persoane dializate nevaccinate înainte de 1995 sau pacienți dializați cronic care necesită doze booster documentate serologic;
2. persoane cu infecție HIV/SIDA;
3. persoane cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;
4. persoane care beneficiază de terapie imunosupresoare;
5. contactii direcți ai cazurilor confirmate cu hepatită B;
6. persoane cu hepatopatii cronice: hepatită C, ciroză, ficat nonalcoolic, hepatită autoimună, nivel persistent al ALT/AST de 2 ori mai mare decât normalul;
7. persoane cu asplenie;
8. persoane din grupa de vârstă 19 -59 de ani cu diabet zaharat; pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani recomandarea rămâne la latitudinea medicului curant;
9. persoane cu boli ereditare predispozante pentru ciroza hepatică: boala Wilson, deficit de alpha-1 antitripsină, hemocromatoză;
10. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar nevaccinat sau cu nivel al Ac antiHBs mai mic de 10 UI, după 3 doze de vaccin hepatitic B;

e) pentru vaccinarea împotriva varicelei segmentul populațional care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor, este următorul: contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;

f) pentru vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor sunt următoarele:

1. persoane cu transplant medular;
2. contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;